

# TIROCINIO

Il tirocinio prevede un totale di 1500 ore distribuite per tutti e tre gli anni di studio. E' diviso in:

## PRIMO ANNO:

- PRIMO SEMETRE 100 ore
- SECONDO SEMETRE 200 ore

## SECONDO ANNO:

- PRIMO SEMETRE 225 ore
- SECONDO SEMESTRE 250 ore

## TERZO ANNO:

- PRIMO SEMETRE 350 ore
- SECONDO SEMESTRE 375 ore

In base all'anno e al semestre è prevista inoltre un'ulteriore ripartizione per quanto riguarda le diagnostiche a cui è possibile accedere e in cui è possibile fare tirocinio:

## PRIMO ANNO:

- PRIMO SEMESTRE: accettazione radiologia, accettazione Pronto Soccorso, accettazione Neuro.
- SECONDO SEMESTRE: diagnostica di ortopedia, sala toraci, pronto soccorso.

## SECONDO ANNO:

- PRIMO SEMESTRE: diagnostica di ortopedia, sala toraci, pronto soccorso, sala TC neuro e TC body.
- SECONDO SEMESTRE: sala TC body, sala TC neuro, Radioterapia, Medicina Nucleare, Mammografia

## TERZO ANNO:

- PRIMO SEMESTRE: sala TC body, sala TC neuro, Radioterapia, Medicina Nucleare, Mammografia, Risonanza Magnetica (1,5T e 3T), sala Angiografica ed Emodinamica.
- SECONDO SEMESTRE: tutte.

La divisa prevede: **camice bianco** e **DOSIMETRO** obbligatorio per poter entrare all'interno delle diagnostiche. INOLTRE, all'interno di specifiche diagnostiche, come ad esempio la Medicina Nucleare, la sala Angiografica o la sala operatoria sono obbligatori anche l'utilizzo di **camice piombato e collare paratiroide**.

Il DOSIMETRO viene consegnato ad ogni singolo studente in seguito ad una serie di visite specifiche (visita oculistica, dermatologica, cardiologica, rx torace e analisi del sangue) atte a dimostrare l'idoneità del soggetto all'esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti. E' composto da un involucro piombato con all'interno una placchetta che rileva la quantità di radiazioni a cui il soggetto viene esposto. Questa placchetta va sostituita in maniera periodica ogni mese. Nel caso in cui da questa si rilevasse un'esposizione potenzialmente rischiosa, il soggetto viene subito tutelato e allontanato dalla diagnostica.



DOSIMETRO PERSONALE.



CAMICE PIOMBATO E COLLARE PARATIROIIDE.